

CORYZALIA®

Szublingvális bevont tablettá Homeopátiás gyógyszerkészítmény

Növényi és állati eredetű anyagok felhasználásával készült szublingvális tablettá.

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.

- E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.
- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.

1. MILYEN HATÓANYAGOT ÉS SEGÉDANYAGOT TARTALMAZ A CORYZALIA TABLETTÁ?

Összetétel:

1 tablettá hatóanyagtartalma:

Allium cepa..... C 3 ... 0,333 mg
Atropa belladonna.. C 3 ... 0,333 mg
Sabadilla officinalis.. C 3 ... 0,333 mg
Kalium
bichromicum C 3 ... 0,333 mg
Gelsemium
sempervirens..... C 3 ... 0,333 mg
Pulsatilla vulgaris.... C 3 ... 0,333 mg

Segédanyagok: magnézium-sztearát, talkum, szacharóz (kb. 270 mg), arambézga, zselatin, fehér méhviasz, karnauba pálmaviasz.

2. MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ A CORYZALIA TABLETTÁ?

Alkalmazható felső légúti hurut, megfázás okozta fejfájás, ornyálkahártya-gyulladás, orrgaratgyulladás, nátha, szénanátha esetén.

3. HOGYAN FEJTI KI HATÁSÁT A CORYZALIA TABLETTÁ?

A homeopátiás gyógyszerek a szervezet öngyógyító törekvésének serkentésére hatnak. A Coryzalia tablettá hatóanyagait a homeopátiás

alkalmazáskor az alábbi betegségek, ill. tünetek enyhítését és gyógyítását segítik:

Allium cepa: allergiás vagy vírusos eredetű nátha; gége- és légcsőhurut; kezdődő számarköhögés.

Atropa belladonna: nyálkahártya tünetek csökkentése (pl. orr-, garat-, torokgyulladásban; gége-légcsőhurutban) és nyelési nehézséget kiváltó szájszárazság esetén.

Sabadilla officinalis: ornyálkahártya-gyulladás, rohamokban jelentkező tüszögés, bőséges orrfolyás.

Kalium bichromicum: akut és krónikus ornyálkahártya-gyulladás; melléküreggyulladás (sinusitis) jellegzetes zöldessárga váladékozással.

Gelsemium sempervirens: meghűlést követő adinamikus, fokozottan jelentkező lázas tünet együttes (vértolulásos fejfájás, összetörtség-érzés).

Pulsatilla vulgaris: elsősorban az íz- és szagérzés elvesztésével együttjáró ornyálkahártya-gyulladás; szénanátha; visszatérő orrgaratgyulladás és hörghurut kezelése; krónikus fülkürthurut.

4. MILYEN ADAGBAN ÉS MILYEN GYAKRAN HASZNÁLJA A CORYZALIA TABLETTÁ?

Adagolás és alkalmazás

Ha az orvos másképp nem rendel szokásos adagja:

Az első napon óránként 1-1 tablettá (max. 12 db).

A második naptól kezdve az alkalmazás gyakorisága ritkítható a tünetek enyhülésének megfelelően:

2-3 óránként 1-1 tablettá. Amennyiben a panaszok a kezelés ellenére tartósan (3 napon túl is) fennállnak, javulás nem következik be, forduljon kezelőorvoshoz vagy gyógyszerészhez.

Az alkalmazás módja:

A Coryzalia tablettákat étkezés előtt fél órával kell a nyelv alatt lassan elszopogtatni.

5. MIRE KELL FIGYELNI A CORYZALIA TABLETTA SZEDÉSEKOR?

A homeopátiás gyógyszerek alkalmazásának kezdetén jellemző a panaszok átmeneti súlyosbodása. Nem várt tünetek jelentkezéséről tájékoztassa kezelőorvosát! A már szedett gyógyszereit csak orvosával való konzultálás után változtathatja meg, ill. csökkentheti azok adagját. *Cukorbetegség* esetén figyelembe kell venni, hogy a Coryzalia készítmény tablettánként kb. 270 mg szacharózt tartalmaz.

6. MIKOR NEM SZABAD A CORYZALIA TABLETTÁT ALKALMAZNI?

A gyógyszer bármely komponense iránti ismert túlérzékenység esetén nem alkalmazható, és szedését azonnal abba kell hagyni, ha a terápia közben jelentkeznek a túlérzékenységi tünetek.

7. SZEDHET-E MÁS GYÓGYSZEREKET A CORYZALIA TABLETTÁVAL EGYIDŐBEN?

Más gyógyszerekkel való kölcsönhatás eddig nem ismert. A már szedett gyógyszereit csak orvosával való konzultálás után változtathatja vagy módosíthatja azok adagját.

8. MILYEN MÁS SZEREK BEFOLYÁSOLJÁK A CORYZALIA TABLETTA HATÁSÁT?

A homeopátiás gyógyszerek alkalmazásával egyidőben (+/- fél óra) tilos illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) cukorkát szopogatni, és nem szabad intenzív illatú fogkrémet használni. A kezelés ideje alatt aromás anyagokat tartalmazó kenőcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását.

9. MILYEN NEM KÍVÁNT MELLÉKHATÁSOK LÉPHETNEK FEL A CORYZALIA TABLETTA SZEDÉSE KÖZBEN?

Esetlegesen nyálfolyás felléphet. Ha ez előfordulna, a tablettá szedését átmenetileg abba kell hagyni. Hosszabb ideig tartó, indokolatlan szedése (javallat nélküli alkalmazása) esetén nem kívánt hatások (ún. gyógyszer-

vizsgálati tünetek) léphetnek fel. Ezekről a panaszokról, ill. minden nem várt tünetről tájékoztassa orvosát vagy gyógyszerészét!

10. OKOZ-E GYÓGYSZERFÜGGŐSÉGET/ HOZZÁSZOKÁST?

Gyógyszerfüggőséget, hozzá szokást eddig nem észleltek.

11. A KÉSZÍTMÉNY HATÁSA A GÉPJÁRMŰVEZETÉSHEZ ÉS GÉPEK ÜZEMELTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEKRE

A Coryzalia tablettá előírás szerű alkalmazása esetén nincs hatással a gépjárművezetéshez és a gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre.

12. ADHATÓ-E A CORYZALIA TABLETTA GYERMEKEKNEK?

Csecsemőknek a félrenyelés veszélye miatt nem adható! Azoknak a kisgyermeknek, akik a tablettát biztonsággal el tudják szopogatni, alkalmazható. Ez esetben a felnőtt adag felét, azaz 1/2 tablettát kell adagolni.

13. ALKALMAZHATÓ-E A CORYZALIA TABLETTA TERHESSÉG ÉS SZOJTATÁS IDEJE ALATT?

Terhesség, ill. szoptatás időszakában alkalmazásával kapcsolatban kockázatokról eddig nem jelentettek adatokat. Ezekben az időszakokban alkalmazására vonatkozóan kérdezze meg kezelőorvosát.

14. HOGYAN KELL TÁROLNI A CORYZALIA TABLETTÁT?

Szobahőmérsékleten, 25 °C alatt, az eredeti csomagolásában tárolandó. Célszerű az eredeti külső csomagolásban tárolni, fénytől, közvetlen napsugárzástól és erős elektromágneses hatásoktól védve. A gyógyszer gyermekek elől elzárva tartandó. A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Laboratoires BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon,
France

OGYI-HG - 107/01

Betegtájékoztató OGYI-eng.
száma: 15.613/75/2003